MICHEL GERBER

DAS GERBER-MODELL

Eine neue Sicht auf Ursprung und Struktur des Universums

DAS GERBER-MODELL

DAS GERBER-MODELL

Eine neue Sicht auf Ursprung und Struktur des Universums

MICHEL GERBER

2025

Impressum

© 2025 Michel Gerber
Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ausserhalb der gesetzlichen Schranken des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Genehmigung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für:

– Vervielfältigungen jeder Art
– Übersetzungen
– Mikroverfilmungen
– Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen
– Öffentliche Wiedergabe und Verbreitung

Erste Ausgabe 2025
Privatdruck / Selbstverlag
Autor: Michel Gerber
Titel: *Das Gerber-Modell – Eine neue Sicht auf Ursprung und Struktur des Universums*

Dieses Werk stellt ein theoretisches Modell dar. Trotz sorgfältiger Recherchen und physikalischer Analyse erhebt es keinen Anspruch auf vollständige wissenschaftliche Allgemeingültigkeit.
Alle Interpretationen entsprechen dem Stand des Wissens im Jahr 2025 sowie eigenständigen Überlegungen des Autors.

Herstellung und Gestaltung: Privat
Druckort: Schweiz

Widmung

Gewidmet der Serie *The Big Bang Theory*,
deren Humor, Neugier und spielerische
Wissenschaftsbegeisterung
den Funken für die Idee dieses Modells entzündeten.

Und gewidmet all jenen,
die bereit sind, alte Grenzen zu hinterfragen,
neue Wege zu denken
und im Unbekannten nicht Leere,
sondern Möglichkeiten zu sehen.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 12

1. Kapitel 1: Grenzen klassischer Urknallmodelle 17

1.1 Historischer Kontext der Urknallhypothese 17

1.2 Mathematische Probleme 19

1.3 Das Homogenitätsproblem 21

1.4 Das Flachheitsproblem 23

1.5 Das Klumpungsproblem 25

1.6 Divergierende Altersbestimmungen 27

2. Kapitel 2: Grenzen des klassischen Urknallmodells 30

2.1 Historische Entwicklung und konzeptionelle Spannungen 31

2.2 Mathematische Problemfelder 32

2.3 Das Homogenitätsproblem 33

2.4 Das Flachheitsproblem 34

2.5 Das Klumpungsproblem 35

2.6 Divergenzen des klassischen Modells 37

3. Kapitel 3: Das transprimordiale Fundament 39

3.1 Der trans primordiale Raum 40

3.2 Mathematische Beschreibung des Raumes 42

3.3 Entstehung der ersten Materiewolken 43

3.4 Kritischer Energieverdichtungswert 44

3.5 Bildung Schwarzer Löcher aus Energieverdichtungen 45

3.6 Mathematische Bedingung für ein primordiales Schwarzes Loch 46

3.7 Stabilität der ersten Schwarzen Löcher 47

4. Kapitel 4: Das trans primordiale Fundament 50

4.1 Das transprimordiale Potentialfeld..... 52

4.2 Entstehung der Materiewolken durch lokale Instabilitäten 54

4.3 Diese Sichtweise ersetzt die Singularität .. 56

5. Kapitel 5: Materie vor dem Urknall – der persistente Massenbestand 59

5.1 Der persistente Massenbestand: Definition und Grundlagen 61

5.2 Kosmologische Altersgrenzen und die Rolle der Wellenlaufzeiten 63

5.3 Materiewolken als präkosmische Struktureinheiten 66

5.4 Konsequenzen für das Verständnis des Universums 68

6. Kapitel 6: Die Rolle Schwarzer Löcher in der galaktischen Entstehung 70

6.1 Entstehung Schwarzer Löcher in transprimordialen Wolken 72

6.2 Die maximale Dichte eines Schwarzen Lochs 74

6.3 Materie + Antimaterie 76

6.4 Galaxie Masse und Schwarzlochmasse sind gekoppelt 78

6.5 Das Schwarze Loch als Sortierer der Materie 79

6.6 Schwarze Löcher als „Gegenpole“ einer Galaxie 81

7. Kapitel 7: Galaxienentstehung durch Schwarze Löcher 83

7.1 Ausgangspunkt: Eine transprimordiale Materiewolke in maximaler Dichte 85

7.2 Bildung des zentralen Schwarzen Lochs ... 86

7.3 Die Umkehrfunktion des Schwarzen Lochs: Ordnung statt Zerstörung 87

7.4 Stabilität der Galaxie durch Masse-Antimasse-Gleichgewicht..... 88

7.5 Entstehung der Galaxie Struktur 89

7.6 Warum alle Galaxien so ähnlich gross sind91

7.7 Mathematischer Zusammenhang zwischen Galaxie- und Schwarzer-Loch-Masse 93

8. Kapitel 8: Galaxienbildung als geordneter Prozess 97

8.1 Der Kern bestimmt die Galaxie 99

8.2 Warum Schwarze Löcher die Materie „umsortieren“..... 102

8.3 Die maximale Grösse einer Galaxie..... 104

8.4 Galaxien als natürliche Standardbausteine 105

9. Kapitel 9: Entstehung trans primordialer Materiewolken 108

9.1 Bildung energetischer Verdichtungszonen 110

9.2 Stabilität und Instabilität: das transprimordiale Jeans-Kriterium 111

9.3 Universelle Eigenschaften der transprimordialen Wolken 113

9.4 Parametrisierung einer Wolke 114

9.5 Mathematisches Beispiel: Skalierung von Masse und Radius 117

9.6 Räumliche Verteilung transprimordialer Wolken 119

9.7 Physikalische Interpretation: Wolken als „Saatkörner“ der Struktur 120

10. Kapitel 10: Energie, Gravitation und Synchronität 122

10.1 Der Energiehaushalt einer transprimordialen Materiewolke 124

10.2 Bildung eines Schwarzen Lochs: Maximale Dichte, minimale Ausdehnung 126

10.3 Gravitation im unendlichen Raum 127

10.4 Synchronität zwischen Schwarzem Loch und Galaxie 129

11. Kapitel 11: Testbare Vorhersagen des Gerber-Modells 135

11.1 Signalverzögerungen und Strahlungsalter 136

11.2 Extremgalaxien jenseits des Standardmodells 139

11.3 Verhältnis von Schwarzem Loch zu Galaxienradius 141

11.4 Wellenfrontanalysen und kosmische Synchronität 143

11.5 Statistische Verteilungsmuster im kosmischen Netz 145

11.6 Die Massenbilanz Schwarzes Loch – Galaxie 146

12. Kapitel 12: Philosophische und physikalische Konsequenzen des Gerber-Modells 149

12.1 Die Rolle von Materie und Energie im unendlichen Raum..... 151

12.2 Die Position des Menschen im Gerber-Modell153

12.3 Konsequenzen für die Zukunft der Kosmologie 155

12.4 Philosophische Reflexion: Ein Universum ohne Anfang 157

12.5 Das Gerber-Modell als Einladung zum Weiterdenken 158

13. Literaturverzeichnis..... 160

Einleitung

Die Frage nach dem Ursprung des Universums gehört zu den ältesten und anspruchsvollsten Herausforderungen der Menschheit. Jede Generation formulierte neue Hypothesen, entwickelte neue Beobachtungsmethoden und schuf neue Modelle, um das Rätsel von Raum, Zeit und Materie zu entschlüsseln. Dennoch besteht bis heute kein endgültiges Verständnis davon, wie das Universum entstand, warum es seine heutige Struktur annahm und ob es überhaupt einen absoluten Anfang gab.

Das klassische Urknallmodell dominiert seit Jahrzehnten die wissenschaftliche Betrachtung. Es beschreibt einen extrem heissen, dichten Anfangszustand, aus dem sich das Universum explosionsartig ausdehnte. Viele Beobachtungen scheinen dieses Modell zu stützen: die kosmische Hintergrundstrahlung, die Rotverschiebung ferner Galaxien, die Häufigkeit leichter Elemente. Doch je genauer die Messungen wurden, desto deutlicher wurden auch die Spannungen innerhalb des Modells. Widersprüche, Parameterfeinabstimmungen und unerklärte Phänomene häuften sich. Die Frage drängt

sich auf, ob der Urknall der wahre Beginn war oder lediglich ein lokales, begrenztes Ereignis in einem weit grösseren und älteren kosmischen Rahmen.

Genau an dieser Stelle setzt das Gerber-Modell an. Es nimmt nicht an, dass Raum, Zeit und Materie aus dem Nichts entstanden.

Stattdessen geht es von einer grundlegenden Prämisse aus:

Der Raum existierte bereits, möglicherweise seit unvorstellbarer Zeit und innerhalb dieses Raumes entstehen Strukturen nicht durch ein einziges kosmisches Ereignis, sondern durch eine Vielzahl voneinander unabhängiger Entstehungsprozesse.

Diese Sichtweise erlaubt eine völlig neue Interpretation vieler beobachteter Phänomene. Wenn der Raum unendlich gross ist und Energie sowie Materie in Form grosser Materiewolken – vergleichbar mit überdimensionierten Oortschen Wolken – verteilt waren, dann könnten aus diesen Wolken durch lokale Kollaps Prozesse jene schwarzen Löcher entstanden sein, die heute als Zentren fast aller Galaxien dienen. Schwarze Löcher wären in diesem Modell keine Endstadien kollabierender Sterne, sondern grundlegende kosmische Generatoren, die Materie

umordnen, Energie freisetzen und umliegende Strukturen formen.

Dies führt zu einer bemerkenswerten Konsequenz: Die entstehenden Galaxien sind nicht zufällige Einzelereignisse, sondern Resultate einer universellen, wiederkehrenden Dynamik. Jede grosse Materiewolke könnte ein eigenes schwarzes Loch gebildet haben. Jedes dieser schwarzen Löcher wiederum könnte als Ausgangspunkt einer neuen Galaxie dienen. So entstünde ein Universum, das auf allen Skalen denselben Grundprinzipien folgt. Ein selbstähnliches, hierarchisches System, das nicht aus einer Singularität stammt, sondern aus der kontinuierlichen Umwandlung und Neuordnung von Energie und Materie.

Zugleich eröffnet das Modell eine alternative Erklärung für die scheinbare Expansion des Universums. Wenn schwarze Löcher und die sie umgebenden Galaxien nicht auseinander „ausexpandieren“, sondern durch Momentumverteilung und lokale Dynamiken voneinander wegdriften, ist kein globaler Expansionsmechanismus erforderlich. Der beobachtete Hubble-Effekt könnte ein emergentes Phänomen sein, das aus dem Zusammenspiel vieler

lokaler Bewegungsprozesse entsteht, nicht aus der Ausdehnung des Raumes selbst.

Das Gerber-Modell versucht nicht, das klassische Urknallmodell vollständig zu ersetzen. Vielmehr bietet es eine erweiterte Perspektive. Eine Möglichkeit, bekannte Beobachtungen in ein Rahmenwerk einzubetten, das ohne Singularitäten, ohne Inflation und ohne absolute Anfänge auskommt. Es betrachtet das Universum nicht als geschlossene Geschichte, sondern als ein System permanenter Transformation, in dem Materie, Energie und Struktur zyklisch entstehen und vergehen.

Dieses Buch führt Schritt für Schritt in diese alternative Sichtweise ein. Es beginnt mit einer kritischen Betrachtung der Grenzen des klassischen Urknallmodells, beschreibt die physikalischen und konzeptionellen Grundlagen des Gerber-Modells und führt anschliessend zu jenen mathematischen und theoretischen Fundamenten, die das Modell konsistent und überprüfbar machen. Dabei wird bewusst darauf geachtet, sowohl wissenschaftlich fundiert als auch für interessierte Laien zugänglich zu bleiben.

Das Ziel ist nicht, Antworten zu liefern, die endgültig sind. Das Ziel ist, Raum für neue Gedanken zu öffnen für die Möglichkeit, dass die Entstehung und Struktur des Universums komplexer, tiefer und vielschichtiger sind, als eine einzige Explosion erklären könnte. Vielleicht beginnt Erkenntnis tatsächlich nicht mit dem Wissen, sondern mit dem Mut, eine einfache Frage neu zu stellen.

1. Kapitel 1: Grenzen klassischer Urknallmodelle

Eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme

1.1 Historischer Kontext der Urknallhypothese

Die heute dominierende Urknalltheorie geht auf Arbeiten von Georges Lemaître (1927) und die Beobachtungen von Edwin Hubble (1929) zurück. Bereits früh zeigte sich ein Zusammenhang zwischen der Rotverschiebung spektraler Linien und der Entfernung kosmischer Objekte, was zur Interpretation einer expandierenden Raumzeit führte.

Spätere theoretische Grundlagen stammen von:

- Alexander Friedmann (1922/1924)
  → Lösung der Einstein'schen Feldgleichungen, Ableitung der Expansion
- George Gamow (1948)
  → Voraussage der Hintergrundstrahlung

Die Erfolge des Modells sind unbestritten:

- relative Elementhäufigkeiten
- kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung (CMB)
- Rotverschiebungs-Entfernungsrelation

Doch im Laufe der Jahrzehnte wurden auch grundsätzliche Schwächen sichtbar, die nicht durch Beobachtungen, sondern durch zusätzliche Hypothesen repariert werden mussten, insbesondere Inflation, Dunkle Materie, Dunkle Energie.

Diese Erweiterungen sind mathematische Werkzeuge, aber keine beobachteten Entitäten.
Damit entsteht die Frage, ob die Grundannahmen des Urknalls selbst unvollständig sind.

1.2 Mathematische Probleme

Singularitäten und Divergenzen

Die Friedmann-Gleichungen beschreiben die Entwicklung der Energiedichte ρ(t) und der Temperatur T(t):

$$\rho(t) \propto \frac{1}{t^2}$$

$$T(t) \propto \frac{1}{t^{1/2}}$$

Für $t \to 0$ divergieren diese Ausdrücke.

Das bedeutet:

- Energie → unendlich
- Temperatur → unendlich
- Raumkrümmung → unendlich

In der Physik gilt jedoch:
Eine Theorie, deren Grenzwerte divergieren, ist unvollständig.

Die klassische Lösung war die Einführung der Inflation (Guth 1981), die die extremen Anfangswerte auf physikalisch akzeptable Grössen streckt. Doch die mathematische Motivation ersetzt keine physikalische Erklärung.

1.3 Das Homogenitätsproblem

Beobachtungen zeigen:

- Die Hintergrundstrahlung besitzt eine Temperaturhomogenität von

$$\Delta T/T \approx 10^{-5}$$

- Regionen, die 46 Milliarden Lichtjahre voneinander entfernt sind, weisen identische thermische Eigenschaften auf

Problem:
Nach klassischer Lichtgeschwindigkeit hätten diese Regionen nie Informationen austauschen können.

Inflation ist die derzeitige Standardlösung, aber sie benötigt:

- ein hypothetisches Inflaton-Feld
- eine extrem fein abgestimmte Potentialform
- spontane, sehr präzise Beendigung der Inflation

Diese Anforderungen wirken wie mathematische Feinkorrekturen, nicht wie natürliche physikalische Prozesse.

1.4 Das Flachheitsproblem

Die beobachtete Raumkrümmung liegt extrem nahe bei Null:

$$|\Omega - 1| < 10^{-60}$$

Dies bedeutet, dass die Anfangswerte *unvorstellbar präzise* eingestellt gewesen sein müssen.

Ein Beispiel verdeutlicht diese Feinabstimmung:



Parameter	Erforderliche Genauigkeit	Bedeutung
Gesamtdichte Ω	1 Teil in 10^{60}	Universum bleibt flach
Hubble-Parameter H_0	<0,1%	Expansion stabil
Dunkle Energie	hypothetisch	notwendig für beschleunigte Expansion

Die Wahrscheinlichkeit eines solch präzisen Anfangswertes ohne dahinterliegende Mechanismen erscheint gering.

1.5 Das Klumpungsproblem

Warum Strukturen existieren

Eine Explosion in einem homogenen Medium erzeugt:

- identische Energieverteilung
- identische Materiedichte
- *keine* grossen Strukturen (Filamente, Voids)

Doch unsere Beobachtungen zeigen:

- Galaxienhaufen
- Supercluster
- grossräumige Leerräume (Voids)
- das „Cosmic Web“-Netzwerk

Diese Strukturen erfordern inhärente Fluktuationen, die im klassischen Urknallmodell nicht vorkommen.

Inflation liefert Quantenfluktuationen, aber:

- das Inflaton-Feld ist unbewiesen
- die Fluktuationen müssen künstlich skaliert werden
- der Energiezustand des Vakuums bleibt undefiniert



1.6 Divergierende Altersbestimmungen

Das Hubble-Problem

Unterschiedliche Messmethoden ergeben verschiedene Werte für die Expansionsrate:

Methode	Hubble-Wert (km/s/Mpc)
Supernovae Typ Ia	73–75
CMB (Planck)	67–68
Gravitationslinsen	73–77
Galaxienhaufen	65–70

Diese Werte können nicht alle korrekt sein.
Das weist darauf hin, dass das zugrunde liegende Modell unvollständig ist.

Eine alternative Erklärung wäre:
Die Expansion ist nicht überall gleich und entstand aus mehreren Quellen.

Darauf wird das Gerber-Modell später aufbauen.

Klassische Urknalltheorie vs. Gerber-Modell

Aspekt	Klassischer Urknall	Das Gerber-Modell
Ursprung	Ein einzelner Anfangspunkt	Viele Ereignisse über lange Zeit
Raum	entsteht beim Urknall	existiert schon vorher, unendlich
Materie	entsteht in Sekundenbruchteilen	existierte vorher oder entsteht regional
Strukturen	Quantenfluktuationen + Inflation	mehrere Quellen, natürliche Clusterbildung
Expansion	universell, gleichförmig	regionale Driftbewegungen
Alter	13,8 Mrd. Jahre	potentiell unendlich
Singularität	unvermeidlich	entfällt vollständig

Übergang zum Kapitel 2:

Die Grenzen klassischer Urknalltheorien zeigen klar:

1. Die Annahme eines singulären Anfangszustands ist physikalisch problematisch.
2. Die Inflation ist mathematisch elegant, aber physikalisch unbewiesen.
3. Die beobachteten Strukturen sprechen gegen ein homogenes Anfangsereignis.
4. Der Raum könnte wesentlich älter und grösser sein als bisher angenommen.

Diese Punkte bilden die Grundlage für das nächste Kapitel

2. Kapitel 2: Grenzen des klassischen Urknallmodells

Das klassische Urknallmodell bildet seit Jahrzehnten das Fundament der modernen Kosmologie. Es beschreibt ein Universum, das aus einem extrem dichten, heissen Zustand hervorgeht und sich seither ausdehnt. Obwohl dieses Modell eine Reihe bedeutender Beobachtungen korrekt vorhersagt, darunter die kosmische Hintergrundstrahlung, die relative Häufigkeit leichter Elemente und die grossflächige Expansion, stösst es an Grenzen, die immer deutlicher werden, je präziser astronomische Messungen werden.

Das Gerber-Modell setzt genau hier an. Um den trans primordialen Rahmen präzise einzuordnen, müssen zunächst jene Bereiche des klassischen Modells betrachtet werden, die ungelöst oder widersprüchlich geblieben sind. Diese Grenzen bilden die Motivation für eine alternative Sichtweise, die Raum, Materie und Zeit in einem umfassenderen Zusammenhang betrachtet.

2.1 Historische Entwicklung und konzeptionelle Spannungen

Die Wurzeln des Urknallmodells reichen zu den Arbeiten von Georges Lemaître (1927), Edwin Hubble (1929) und George Gamow (1948) zurück. Die mathematische Grundlage bildet die allgemeine Relativitätstheorie in Verbindung mit den Friedmann-Gleichungen, aus denen sich expandierende Universen ergeben.

Doch bereits früh zeigte sich ein strukturelles Problem: Die Rückrechnung der Expansion führt zu einem Punkt, an dem die Gleichungen ihre Gültigkeit verlieren. Die Urknall-Singularität, definiert durch unendliche Dichte und Krümmung, ist kein physikalischer Zustand, sondern Ausdruck eines mathematischen Zusammenbruchs.

Die klassische Theorie verlangt damit die Existenz eines Anfangszustands, der weder durch Physik beschrieben noch experimentell getestet werden kann.

2.2 Mathematische Problemfelder

Divergenzen in den Friedmann-Gleichungen

Die Energiedichte ρ und die Temperatur T entwickeln sich bei rückwärtslaufender kosmologischer Zeit wie folgt:

$$\rho(t) = 1 / (6 \pi G t^2)$$

$$T(t) \propto 1 / t^{(1/2)}$$

Für t gegen 0 divergieren beide Grössen. Diese Divergenzen sind in der Physik ein Hinweis darauf, dass das zugrunde liegende Modell unvollständig oder fehlerhaft extrapoliert wird.

Ein physikalisch sinnvolles Modell darf keine nicht-endlichen Zustände benötigen, um erklärbar zu sein.

2.3 Das Homogenitätsproblem

Die kosmische Hintergrundstrahlung weist eine extreme Gleichmässigkeit auf. Regionen, die heute 45 Milliarden Lichtjahre voneinander entfernt sind, zeigen Temperaturunterschiede von weniger als einem Zehntausendstel Grad. Im Standardmodell hätten diese Regionen nie kausalen Kontakt haben dürfen.

Die mathematische Formulierung des Konflikts lautet:

Horizontgrösse klassisch:
$d_H(t) = c\,t$

Beobachtete Homogenität benötigt jedoch:

$d_H(t) \gg c\,t$

Dieser Widerspruch führte zur Einführung der Inflationshypothese, eines extrem schnellen, kurzlebigen Expansionseffekts, dessen Natur bis heute unklar ist.

2.4 Das Flachheitsproblem

Die kritische Dichte des Universums ergibt sich aus:

$\rho_{crit} = 3 H^2 / (8 \pi G)$

Beobachtungen zeigen, dass die tatsächliche Dichte $\Omega = \rho / \rho_{crit}$ extrem nahe bei 1 liegt. Theoretisch müsste die Feinabstimmung im frühen Universum bei 1 zu 10 hoch 60 gelegen haben, was physikalisch unwahrscheinlich ist. Auch hier wird Inflation als Lösung vorgeschlagen, doch diese erzeugt wiederum neue Abstimmungsprobleme.

2.5 Das Klumpungsproblem

In einem homogenen, isotropen Anfangszustand entstehen ohne zusätzliche Mechanismen keine Dichtekontraste. Galaxien, Filamente und Voids setzen jedoch frühe Inhomogenität voraus.

Das klassische Modell muss diese durch hypothetische Quantenfluktuationen im Inflationsfeld einführen. Diese Fluktuationen sind aber an keine experimentell bekannte Feldtheorie gekoppelt.

Im Gerber-Modell hingegen entstehen Inhomogenitäten natürlich durch mehrere voneinander unabhängige Entstehungsereignisse und durch die Struktur bereits existierender Materiewolken.

Klassisches Modell vs. Gerber-Modell

Aspekt	Klassisches Urknallmodell	Gerber-Modell
Ursprung des Raumes	Raum entsteht mit dem Urknall	Raum existiert bereits, unendlich groß
Anzahl der Ereignisse	Ein einzelner Anfangspunkt	Vielzahl transprimordialer Ereignisse
Materieentstehung	Materie entsteht plötzlich	Materie existiert vorher in Wolken
Homogenität	muss erklärt werden	ergibt sich durch verteilte Ereignisse
Singularität	unvermeidlich	existiert nicht
Strukturentstehung	Inflation + Quantenrauschen	natürliche Folge ungleichzeitiger Prozesse
Wellenlaufzeiten	einheitlich angenommen	unterschiedlich → älteres Universum
Beobachtbares Universum	Gesamtheit	nur ein lokaler Ausschnitt

2.6 Divergenzen des klassischen Modells



x-Achse: kosmologische Zeit t
y-Achse: Energiedichte ρ(t) und Temperatur T(t)

Beide Kurven steigen steil nach oben, je näher man t = 0 kommt. Die Funktion wird nahe t = 0 nahezu vertikal. Dieses Diagramm soll verdeutlichen, dass das Modell physikalisch unplausible Werte benötigt.

Übergang zum Kapitel 3:

Die in diesem Kapitel dargestellten Grenzen zeigen, dass das klassische Urknallmodell zwar erfolgreich, aber nicht vollständig ist. Seine Kernannahme, ein einzelner Anfangszustand, erzeugt mehr offene Fragen als beantwortete.

Kapitel 3 führt deshalb in das Konzept des trans primordialen Raumes ein:

Einen unendlichen, bereits vororganisierten Raum, in dem Materie existiert, bevor lokale Ereignisse galaktische Entwicklung auslösen.

Das nächste Kapitel wird also erklären:

Was ist der trans primordiale Raum
Welche physikalischen Eigenschaften besitzt er
Warum ist er notwendig, um die zuvor beschriebenen Widersprüche zu lösen

3. Kapitel 3: Das transprimordiale Fundament

Überblick und Zielsetzung des Kapitels

Während Kapitel 2 die strukturellen und mathematischen Schwächen des klassischen Urknallmodells darstellte, führt dieses Kapitel den konzeptionellen Rahmen ein, auf dem das Gerber-Modell aufbaut. Es beschreibt die physikalischen Eigenschaften eines präexistenten, unendlichen Raumes, dessen Zustand weder einem Vakuum noch einer physikalischen Leere entspricht, sondern einer homogenen Verteilung von Energiepotenzialen, aus denen Materiewolken, Schwarze Löcher und später Galaxien entstehen können.

Der trans primordiale Raum bildet damit die grundlegende Bühne, auf der alle späteren kosmischen Prozesse stattfinden. Er ist nicht das Ergebnis eines Urknalls, sondern dessen Voraussetzung.

3.1 Der trans primordiale Raum

Eigenschaften eines unendlichen Raumes

Das Gerber-Modell geht davon aus, dass der Raum bereits vor jeglichem Entstehungsereignis existierte.

Dieser Raum besitzt folgende Eigenschaften:

- Unendliche räumliche Ausdehnung
  Kein Rand, keine Grenze, keine kompakte Struktur
- Keine inhärente Dynamik
  Raum dehnt sich nicht aus und kontrahiert nicht; Bewegungen resultieren allein aus Materie und Energie
- Gleichmässiges Energiegrundpotenzial
  Überall im Raum existiert eine minimal-positive energetische Feldstärke, bezeichnet als

$$E_0 > 0.$$

- Keine privilegierten Orte
  Jeder Punkt ist physikalisch äquivalent (ähnlich dem kosmologischen Prinzip), allerdings ohne zeitliche Einschränkung
- Unendliches Alter
  Der Raum selbst ist zeitlos oder unendlich alt, da Zeit erst durch Materie-Energie-Interaktionen definiert wird

3.2 Mathematische Beschreibung des Raumes

Der trans primordiale Raum lässt sich durch ein konstantes, isotropes Energiefeld modellieren:

$$E(\vec{x}) = E_0 \quad \forall\, \vec{x} \in \mathbb{R}^3.$$

Dieses Feld ist:

- konservativ (keine Netto-Arbeit über geschlossene Wege)
- stabil (keine spontane Selbstverdichtung)
- homogen (keine Fluktuationen zu Beginn)

Die Stabilität kann durch die Bedingung formuliert werden:

$$\nabla E(\vec{x}) = 0,$$

also keinerlei räumliche Gradienten.

3.3 Entstehung der ersten Materiewolken

Energieverdichtung im transprimordialen Feld

Materie entsteht im Gerber-Modell nicht spontan, sondern durch lokale Verdichtungsprozesse des Energiepotenzials, vergleichbar mit Gravitationspotenzialminima, jedoch ohne vorhandene Masse.

Das kann mathematisch als spontanes Einsetzen eines lokalen Energiegradienten beschrieben werden:

$$\nabla E(\vec{x}) \neq 0.$$

Dies führt zur Ausbildung von Energieansammlungen:

$$E(\vec{x}) \to E_0 + \Delta E(\vec{x}),$$

wobei ΔE zu einem kritischen Wert anwächst, der eine Materiewolke auslöst.

3.4 Kritischer Energieverdichtungswert

Die Entstehung einer Materiewolke setzt ein, wenn:

$$\Delta E(\vec{x}) \geq E_{\text{krit}},$$

mit

- E_{krit}: minimaler Energieinhalt, der notwendig ist, um stabile Materiestrukturen zu erzeugen.
- typischerweise viel kleiner als die Energie einer Galaxie, aber wesentlich grösser als heutige Energiefluktuationen.

Physikalisch entspricht dies einem „Phasenübergang“ im ursprünglichen Feld.

3.5 Bildung Schwarzer Löcher aus Energieverdichtungen

Im Gerber-Modell entstehen Schwarze Löcher nicht aus kollabierenden Sternen, diese Erklärung gilt nur für späte kosmische Epochen.
Die ersten Schwarzen Löcher sind direkte Produkte des transprimordialen Energiepotenzials.

3.6 Mathematische Bedingung für ein primordiales Schwarzes Loch

---

Ein solches Schwarzes Loch bildet sich, wenn die Energiedichte in einem Volumen V einen Schwellenwert überschreitet:

$$\rho_E = \frac{1}{V} \int_V (E_0 + \Delta E(\vec{x}))\, d^3x \geq \rho_{\text{krit}}.$$

Dies führt zur spontanen Raumkrümmung und damit zur Entstehung eines Ereignishorizontes.

3.7 Stabilität der ersten Schwarzen Löcher

Diese Schwarzen Löcher:

- haben eine definierte maximale Dichte
- sind nicht unendlich klein
- können keine unendliche Masse enthalten

Die maximale Dichte $\rho_{\max}$ folgt aus:

$$\rho_{\max} = \frac{3c^6}{32\pi G^3 M_{\text{krit}}^2}.$$

Damit ergibt sich direkt:

- Es gibt keine Singularität
- Schwarze Löcher haben eine endliche Kernstruktur
- Schwarze Löcher können gesättigt sein

Dies bildet später die Grundlage für eine hochgeordnete Bildung von Galaxien.

Vergleich der Grundannahmen

Aspekt	Klassisches Modell	Gerber-Modell
Ursprung des Raumes	Raum entsteht mit dem Urknall	Raum existiert unendlich lange
Energieverteilung	unklar	homogenes Grundpotenzial E_0
Materiebildung	einmalig im Urknall	fortlaufend durch Energieverdichtungen
Schwarze Löcher	Ergebnis von Sternkollaps	primordiale Strukturbildner
Galaxieentstehung	zufallsgetrieben	geordnet durch Schwarze-Loch-Zentren

Übergang zum Kapitel 4:

Mit der Definition des trans primordialen Raumes und der ersten Materiewolken ist nun die Grundlage gelegt für das Verständnis, wie aus diesen Energieverdichtungen Schwarze Löcher entstehen, Materie sortiert wird und Galaxienformen entstehen.

Dort wird erklärt:

- warum Materie bereits vor klassischen Entstehungsereignissen existieren konnte
- wie Materie und Energie im Gerber-Modell ineinander umgewandelt werden
- und warum das Universum dadurch viel älter sein muss als bisher angenommen.

4. Kapitel 4: Das trans primordiale Fundament

Raum vor der Zeit

Das Gerber-Modell geht von einer grundlegenden Annahme aus, die das klassische kosmologische Denken erweitert:

Der Raum ist kein Produkt des Urknalls, sondern dessen Bühne.

Während im Standardmodell Raum und Zeit aus einer Singularität hervorgehen, nimmt das trans primordiale Fundament an, dass der Raum bereits vorher existierte, nicht als dynamische Raumzeit, sondern als statische, unbegrenzte geometrische Struktur, vollständig frei von Materie, aber nicht frei von physikalischem Potential.

Dieser „prä-physikalische“ Raum besass drei entscheidende Eigenschaften:

1. Unendliche Ausdehnung
   Keine Grenzen, keine Kompaktheit, keinerlei topologische Einschränkung.
2. Energetische Gleichverteilung
   Eine homogene Verteilung eines „trans primordialen Grundpotentials“, das selbst keine Materie ist, aber Materie entstehen lassen kann.
3. Zeitlosigkeit
   Zeit ist nicht definiert, solange keine Veränderung vorliegt.
   Das Universum beginnt erst Zeit zu „haben“, sobald Prozesse einsetzen.

Diese Sichtweise löst mehrere fundamentale Probleme klassischer Modelle:

Singularitäten existieren nicht, Expansion ist kein notwendiges Konzept, und die Frage „Was war davor?“ ist klar beantwortet:
ein unbegrenzter, statischer, potenzieller Raum.

4.1 Das transprimordiale Potentialfeld

Das Herzstück des Fundaments ist die Annahme eines allgegenwärtigen Feldes, das die Möglichkeit zur Materieentstehung besitzt.

Wir bezeichnen es als:

$$\Phi_{tp}(x)$$

wobei x ' einen Ort im unendlichen Raum beschreibt.

Eigenschaften des Feldes:

- Kontinuierlich
  Keine punktartigen Singularitäten.
- Homogen

$$\frac{\partial \Phi_{tp}}{\partial x_i} = 0$$

für alle Raumrichtungen x_i .

- Nicht-materiell
  Das Feld trägt Energie, aber keine Masse
- Stabil
  Solange keine Störung eintritt, bleibt das Feld zeitlos unverändert

Interpretation

Dieses Feld kann als „Grundrauschen der Existenz“ verstanden werden.
Es ist keine Energieform im thermodynamischen Sinn, sondern ein „Potentialzustand“, der erst bei lokalen Instabilitäten reale Energie erzeugt.

4.2 Entstehung der Materiewolken durch lokale Instabilitäten

Materie entsteht nicht spontan überall, sondern an Punkten, an denen das trans primordiale Feld aus dem Gleichgewicht gerät.
Eine Instabilität tritt auf, wenn ein lokaler **Störungswert $\delta\Phi$ einen kritischen Wert überschreitet:**

$$|\delta\Phi| > \Phi_{\text{krit}}$$

In diesem Moment beginnt das Feld reale Energie freizusetzen, die sich in Materiewolken verdichtet.

Mathematisch beschreibt man den Übergang durch:

$$\Phi_{tp} \rightarrow E \rightarrow M$$

mit:

- E ... Energie
- M ... Masse gemäss $E = mc^2$

Dichtefunktion einer entstehenden Materiewolke

$$\rho(r,t) = \rho_0 \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma(t)^2}\right)$$

Dies entspricht einem wachsenden, kugelförmigen Materiecluster.

Bedeutung im Gerber-Modell

Diese Wolken sind der Ursprung:

- der späteren schwarzen Löcher
- der Galaxien
- und der kosmischen Strukturen

Sie sind keine Folge eines Urknalls, sondern dessen Voraussetzung.

4.3 Diese Sichtweise ersetzt die Singularität

In klassischen Modellen divergieren Energiedichte, Temperatur und Krümmung.
Im Gerber-Modell bleibt jede physikalische Grösse endlich, weil kein Zustand jemals unendlich dicht wäre.

Statt einer Singularität gilt:

$$\lim_{t \to t_0} \rho(t) < \infty$$

und

$$R(t) < \infty$$

Konsequenzen:

- Keine Verletzung physikalischer Gesetze
- Kein mathematischer Ausnahmezustand
- Kein Beginn von Raum und Zeit, sondern ein Beginn lokaler Physik

Vergleich zum klassischen Modell

Aspekt	Klassisches Modell	Gerber-Modell
Ursprung von Raum	entsteht im Urknall	existiert unendlich vorher
Zeit	beginnt im Urknall	beginnt lokal mit Veränderungen
Singularität	unvermeidlich	vollständig nicht existent
Materieentstehung	einmalig, simultan	mehrfach, zeitlich gestaffelt
Rolle von Energie	primäres Urknallsignal	Potential, das erst Störungen benötigt
Homogenität	muss erklärt werden	ergibt sich aus Feldstabilität
Notwendigkeit von Inflation	zwingend	entfällt

Übergang zum Kapitel 5:

Materie vor dem Urknall, der persistente Massenbestand

Das nächste Kapitel widmet sich einer zentralen These des Gerber-Modells:
Wenn Materie nicht aus einem einzigen Ereignis entstanden ist, muss ein Teil von ihr älter sein, als jedes heute sichtbare Signal.

Wir werden zeigen:

- warum Materie nicht gleichzeitig entstehen konnte
- wie Massenbestandteile Milliarden Jahre älter sein können als ihre heutigen Strukturen
- und welche Konsequenzen dies für Galaxien, Schwarze Löcher und kosmische Entfernungen hat

5. Kapitel 5: Materie vor dem Urknall – der persistente Massenbestand

Einleitung: Die Frage nach der Herkunft der Masse

Das klassische Urknallmodell geht davon aus, dass **alle Materie**, die heute existiert, in einem winzigen Zeitfenster unmittelbar nach dem Urknall entstanden ist. Diese Annahme ist problematisch, da sie extreme Anfangsbedingungen, hohe Temperaturgrenzen und eine präzise Feinabstimmung erfordert, um die beobachtete Strukturvielfalt überhaupt ermöglichen zu können.

Das Gerber-Modell löst dieses Problem durch einen Ansatz, der sowohl physikalisch plausibel als auch mathematisch konsistent ist:

Materie ist nicht im Urknall entstanden.
Sie war bereits vorher vorhanden.

Der Urknall

oder im trans primordialen Vokabular:

das lokale Entstehungsereignis, hat lediglich einen Teil der vorhandenen Materie in neue Konfigurationszustände überführt und verdichtet.

Damit eröffnet sich die Möglichkeit, dass einzelne Massenkomponenten:

- älter sind als das beobachtbare Universum
- unterschiedliche Entstehungszeiträume besitzen
- in verschiedenen kosmischen Regionen gewachsen sind
- und längst jenseits unserer Beobachtungsgrenzen existieren

Dies nennt man im Gerber-Modell den persistenten Massenbestand.

5.1 Der persistente Massenbestand: Definition und Grundlagen

Unter persistentem Massenbestand wird jene Materie verstanden, die lange vor einem lokalen Entstehungsereignis existierte, und die weder neu gebildet noch zerstört wird, sondern lediglich ihren Aggregations- oder Energiezustand verändert.

Formal lässt sich dies wie folgt ausdrücken:

Massenerhaltung über präkosmische Zeiträume

Die totale Masse M eines Systems über kosmische Zeiträume erfüllt:

$$\frac{dM}{dt} = 0$$

wobei gilt:

$$M = M_{\text{lokal}}(t) + M_{\text{extern}}(t)$$

mit:

- M_{lokal} ... Materie, die am beobachtbaren Entstehungsereignis beteiligt war
- M_{extern} ... Materie, die aufgrund räumlicher Entfernung oder unterschiedlicher Wellenlaufzeiten nicht beobachtbar ist

Da die Gesamterhaltung gilt, folgt:

$$M_{\text{vor dem Ereignis}} = M_{\text{nach dem Ereignis}}$$

Dies bedeutet:
Der Urknall hat keine Materie erzeugt, sondern lediglich umverteilt.

5.2 Kosmologische Altersgrenzen und die Rolle der Wellenlaufzeiten

---

Ein wesentliches Argument des Gerber-Modells basiert auf der Frage:

Warum erscheinen alle kosmischen Signale so, als wären sie gleich alt?

Die Antwort liegt in der Physik von Informationsübertragung und Wellenlaufzeiten.

Unterschiedliche Signale, selbst wenn sie aus derselben Region stammen, erreichen uns nicht simultan:

- Photonen hoher Energie propagieren nahezu ungehindert.
- Massivere oder quantenfluktuationsbasierte Informationsanteile benötigen deutlich länger.
- Strukturelle Informationen können sogar völlig verschwinden oder jenseits des kosmischen Horizonts liegen.

Damit wird klar:

Das sichtbare Universum hat lediglich die schnellsten Signale empfangen; die langsameren tragen Informationen über ältere Materie, die wir noch nicht sehen, oder nie sehen werden.

Mathematischer Rahmen

Für zwei Signale verschiedener Natur gilt:

$$t_{\text{Ankunft}} = \frac{d}{v}$$

mit:

- d ... kosmische Distanz
- v ... Ausbreitungsgeschwindigkeit des Signals

Da unterschiedliche Signale unterschiedliche effektive Geschwindigkeiten aufweisen können, folgt:

$$t_{\text{Ankunft, 1}} \neq t_{\text{Ankunft, 2}}$$

Für ein Ereignis, das zu einer Zeit t_0 stattfand, bedeutet dies:

$$t_{\text{wahr}} = \max(t_{\text{Ankunft}})$$

Das tatsächliche Alter ist also immer grösser als das gemessene Alter:

$$t_{\text{wahr}} > t_{\text{gemessen}}$$

Dies stützt die Hypothese, dass Teile des Universums deutlich älter als 13,8 Milliarden Jahre sind, möglicherweise hundert Milliarden Jahre oder älter.

5.3 Materiewolken als präkosmische Struktureinheiten

Wenn Materie vor dem Urknall existierte, muss sie in Strukturen gebunden gewesen sein, die unabhängig von lokalen Ereignissen existieren konnten.

Das Gerber-Modell nennt diese Strukturen:

Transprimordiale Materiewolken

Sie zeichnen sich aus durch:

- hohe Massendichte
- starke interne Gravitation
- die Fähigkeit, Schwarze Löcher zu erzeugen
- extrem lange Lebensdauern

Sie wirken wie Quellen, die in späteren Phasen Galaxien, Sterne und Planeten erst ermöglichen.

Mathematisch lässt sich das notwendige

Mindestmass M_{krit} einer solchen Wolke abschätzen durch:

$$M_{\text{krit}} \approx \frac{c^2 R}{2G}$$

gesetzt für einen Radius RRR, der gerade ausreicht, um ein Schwarzes Loch zu bilden.

Dies bestätigt:

Eine Materiewolke benötigt keine Entstehung durch einen Urknall, sondern lediglich eine genügend starke Gravitationskonzentration.

5.4 Konsequenzen für das Verständnis des Universums

Die Existenz eines persistenten Massenbestands führt zu mehreren revolutionären Einsichten:

1. Das Universum hat keinen Anfang im klassischen Sinne.
   Es existiert seit unbestimmter Zeit, möglicherweise unendlich.
2. Entstehungsereignisse sind lokal, nicht global.
   Die Geschichte des Kosmos ist kein einzelner Knall, sondern ein Mosaik vieler Geburtsregionen.
3. Schwarze Löcher sind Ergebnis, nicht Ursprung.
   Sie entstehen aus Materiewolken, nicht aus einem Urknall.
4. Galaxien sind natürliche Endprodukte der Materien Evolution.
5. Der Urknall ist nur ein regionaler Ausdruck eines viel grösseren, ewig existierenden Prozesses.

Übergang zum Kapitel 6:

Das nächste Kapitel widmet sich einem zentralen Thema des Gerber-Modells:

Wie Materie in trans primordialen Wolken zu Schwarzen Löchern wird und wie daraus Galaxien entstehen.

Wir betrachten:

- den Kollaps einer Materiewolke
- die Bildung eines zentralen Schwarzen Lochs
- die Rolle von Gravitation und Energieverteilung
- und warum dieser Prozess zu nahezu identischen Galaxie Strukturen führt

6. Kapitel 6: Die Rolle Schwarzer Löcher in der galaktischen Entstehung

---

Symmetrie, Masseerhaltung und die bipolare Struktur des Kosmos

Schwarze Löcher sind in der modernen Astrophysik vor allem als extrem dichte Objekte bekannt, deren Gravitation so stark ist, dass selbst Licht nicht entkommen kann.

Im Gerber-Modell jedoch spielen sie eine tiefere, fundamentale Rolle:

Sie sind nicht das Endprodukt gravitativer Kollaps Prozesse, sondern der strukturbildende Motor ganzer Galaxien.

Dieses Kapitel untersucht drei zentrale Thesen:

1. Schwarze Löcher entstehen aus trans primordialen Materiewolken und besitzen von Beginn an eine definierte maximale Dichte.

2. Jedes Schwarze Loch besteht aus einer symmetrischen „Materie–Antimaterie-Bilanz“, die seine Stabilität und seine Kopplung an die Galaxie bestimmt.

3. Der Wachstumsprozess eines Schwarzen Lochs führt nicht zu unbegrenzter Massezunahme, sondern zu Umwandlung innerhalb einer internen Bilanzgleichung, ein Konzept, das im Standardmodell völlig fehlt.

6.1 Entstehung Schwarzer Löcher in transprimordialen Wolken

Trans primordiale Materiewolken enthalten:

- genügend Masse
- genügend freie Energie
- eine ausreichend grosse räumliche Ausdehnung

um unter Gravitation nicht sofort Sterne zu bilden, sondern zuerst ein zentrales Kollaps Zentrum auszubilden.

Im Gegensatz zum klassischen Modell, das Schwarze Löcher als das Endstadium grosser Sterne betrachtet, geht das Gerber-Modell weiter:

Eine Galaxie entsteht NUR, wenn zuerst ein Schwarzes Loch entsteht.

Denn:

- Sterne benötigen schwere Elemente
- Schwere Elemente benötigen Druck, Gravitation und Umwandlungsprozesse
- Diese Prozesse entstehen erst durch ein Schwarzes Loch

Somit ist das Schwarze Loch Ursprung, nicht „Abfallprodukt“.

6.2 Die maximale Dichte eines Schwarzen Lochs

Ein zentrales Postulat des Gerber-Modells lautet:

Jedes Schwarze Loch hat eine maximale Dichte, die nicht überschritten werden kann.

Diese Idee vermeidet Singularitäten und erlaubt mathematische Beschreibung ohne Divergenzen.

Sei die maximale Dichte:

$$\rho_{\max} = \text{konstant}$$

Dann folgt für die maximale mögliche Masse eines Schwarzen Lochs:

$$M_{\max} \propto R^3 \rho_{\max}$$

Da $\rho_{\max}$ konstant ist, bestimmt der Radius die maximale Masse.

Dies erklärt:

- Warum Schwarze Löcher *ähnlicher Masse* im Zentrum von ähnlichen Galaxien stehen
- Warum es keine unendlich grossen Schwarzen Löcher geben kann
- Warum die Grösse der Galaxie an die Masse des Schwarzen Lochs gekoppelt ist



6.3 Materie + Antimaterie

Ein revolutionärer Gedanke des Gerber-Modells:

Ein Schwarzes Loch wächst nicht einfach durch Massezufuhr,
sondern es verbraucht intern Antimaterie, um Materie zu neutralisieren.

Wenn das Schwarze Loch eine Sonnenmasse $M_\odot$ verschlingt, passiert nicht:

$$M_{\text{neu}} = M_{\text{alt}} + M_\odot$$

Sondern:

$$M_{\text{neu}} = M_{\text{alt}} - M_\odot + q$$

mit q als kleiner Rest Term, der die Stabilität des Systems erhält.

Dies entspricht einer bipolaren Bilanz:

$$\text{Materie} + \text{Antimaterie} \rightarrow 0$$

Das Schwarze Loch wird dadurch leichter, nicht schwerer.

Dieser Prozess erklärt drei wichtige kosmische Beobachtungen:

1. Warum Galaxienkerne häufig eine ähnliche Masse haben.
2. Warum Schwarze Löcher niemals unendlich wachsen.
3. Warum Galaxien trotz Wachstum des Schwarzen Lochs stabil bleiben.

6.4 Galaxie Masse und Schwarzlochmasse sind gekoppelt

Wenn ein Schwarzes Loch nur so lange Masse aufnehmen kann, wie Antimaterie zur Neutralisation vorhanden ist, folgt:

- Eine Galaxie wächst nur so lange, bis die interne Antimaterie-Bilanz erschöpft ist
- Danach stabilisiert sich die Galaxie auf einer festen Grössenordnung
- Dies erklärt die eindrucksvolle Regelmässigkeit galaktischer Massenverteilungen

Mathematisch:

$$M_{\text{Galaxie}} \approx k \cdot M_{\text{BH}}$$

mit k als Strukturkonstante, beobachtet zwischen $500 - 3000$.

Das Gerber-Modell erklärt dieses Verhältnis als notwendige Folge der internen Bilanzgleichung, nicht als Zufall oder Empirie.

6.5 Das Schwarze Loch als Sortierer der Materie

Wenn ein Schwarzes Loch Masse verschlingt und Antimaterie intern verbraucht, entsteht ein dynamischer Prozess:

- leichte Elemente werden weiter aussen gehalten
- schwere Elemente wandern nach innen
- rotierende Scheiben (Akkretionsscheiben) entstehen automatisch
- lokale Dichteunterschiede führen zur Sternentstehung

Das bedeutet:

Schwarze Löcher erschaffen Ordnung,
sie sind kosmische Sortiermaschinen.

Statt Chaos entsteht Struktur.

Darum sehen Galaxien:

- spiralförmig
- rotationssymmetrisch
- stabil
- wiederholbar

aus.

6.6 Schwarze Löcher als „Gegenpole“ einer Galaxie

Das Gerber-Modell führt eine physikalische Analogie ein:

Eine Galaxie ist wie ein Magnetfeld.

Das Schwarze Loch ist der Mittelpunkt eines bipolaren Systems.

Die Gravitation der Galaxie und die interne Antimaterie-Bilanz im Schwarzen Loch sind zwei Seiten derselben Struktur.

Dies erklärt:

- warum jede Galaxie ein zentrales Schwarzes Loch hat
- warum deren Masse immer proportional zur Galaxie Masse ist
- warum Galaxien nicht zufällig entstehen
- sondern überall nach einem identischen Muster

Übergang zum Kapitel 7:

Das nächste Kapitel beantwortet die Frage:

Wie führt der Entstehungsprozess eines Schwarzen Loches im trans primordialen Raum zur Bildung einer ganzen Galaxie?

Wir untersuchen:

- die Entstehung von Sternen aus den umgebenden Wolken
- die Rolle der Rotationsdynamik
- die Verteilung der Elemente
- und den Zusammenhang zwischen Schwarzem Loch und galaktischer Morphologie



7. Kapitel 7: Galaxienentstehung durch Schwarze Löcher

Symmetrie, Masseverteilung und strukturelle Konstanz

Im klassischen kosmologischen Modell entstehen Schwarze Löcher als Folgeprozess nach der Bildung der ersten Sterne.

Im Gerber-Modell hingegen kehrt sich diese Reihenfolge um:

Nicht Sterne erzeugen Schwarze Löcher,
sondern Schwarze Löcher erzeugen Sterne und Galaxien.

Dieses Kapitel zeigt:

- warum Schwarze Löcher die *zentralen strukturgebenden Objekte* des Universums sind
- weshalb nahezu jede Galaxie ein zentrales Schwarzes Loch identischer Grössenordnung besitzt
- wie Masseverteilung und Energiebilanz den Aufbau einer Galaxie steuern
- warum Galaxienformen global ähnlich sind (Scheiben, Bulges, Spiralarme)
- und welche mathematischen Beziehungen zwischen Schwarzem Loch und Gesamtmasse der Galaxie bestehen

7.1 Ausgangspunkt: Eine transprimordiale Materiewolke in maximaler Dichte

---

Nach Kapitel 6 kollabiert eine ausreichend dichte trans primordiale Wolke zu einem zentralen Schwarzen Loch.
Dieser erste Schritt ist universell und wiederholt sich in allen Regionen des unendlichen Raumes.

Die Wolke besitzt eine Startmasse M_{W} , eine Dichteverteilung $\rho(r)$ und eine Gesamtenergie E.

Während des Kollapses gilt:

$$E_{\mathrm{grav}} > E_{\mathrm{therm}}$$

→ Die Wolke kann sich nicht stabilisieren → ein Schwarzes Loch entsteht.

7.2 Bildung des zentralen Schwarzen Lochs

Das zentrale Schwarze Loch erhält nicht die gesamte Masse der Wolke, sondern nur den Anteil, der sich innerhalb des Schwarzschildradius ansammelt.

Der Schwarzschildradius lautet:

$$R_s = \frac{2GM}{c^2}$$

Für ein typisches Galaxien-Schwarzes-Loch mit $M = 10^8\, M_\odot$:

$$R_s \approx 3 \cdot 10^8 \text{ km}$$

Ein gigantisches Objekt – aber im Verhältnis zur Galaxie winzig.

Der entscheidende Punkt des Gerber-Modells:

Das Schwarze Loch nimmt nur so viel Masse auf, wie es zur Stabilisierung benötigt, niemals die gesamte Wolke.

7.3 Die Umkehrfunktion des Schwarzen Lochs: Ordnung statt Zerstörung

---

Im klassischen Modell:

- Schwarze Löcher = zerstörerisch

Im Gerber-Modell:

- Schwarze Löcher = strukturstiftend
- Schwarze Löcher = Energiereduktionsmaschinen
- Schwarze Löcher erzeugen Ordnung, nicht Chaos

Durch die Umwandlung von Materie in Antimaterie-Äquivalente:

$$M_{\mathrm{SL}} = M_{\mathrm{Galaxie}} \cdot f$$

mit einem empirischen Faktor
$f \approx 10^{-3}$ bis 10^{-2}.

Diese Relation ist beobachtungskonsistent
(z. B. M–σ-Relation in der realen Astronomie).

7.4 Stabilität der Galaxie durch Masse-Antimasse-Gleichgewicht

---

Eine zentrale Erkenntnis des Gerber-Modells:

Ein Schwarzes Loch wird kleiner, wenn es Materie „verschlingt“,
da dabei Antimasse verbraucht wird.

Damit die Galaxie stabil bleibt, muss gelten:

$$M_{\text{Schwarzloch}} + M_{\text{Antimasse}} = M_{\text{konstant}}$$ und gleichzeitig:

$$F_{\text{grav,SL}} \approx F_{\text{grav,Gal}}$$

Nur dann entsteht ein Gleichgewicht, das:

- die Rotationskurve stabilisiert
- die galaktische Scheibe formt
- Spiralarme ermöglicht
- Dichtewellen konstant hält

7.5 Entstehung der Galaxie Struktur

Die Galaxie formt sich in drei Hauptzonen:

1. Bulge (innerer Bereich)

Starke Gravitation → hohe Sternendichte
Entsteht direkt aus der Restmaterie der kollabierten Wolke.

2. Scheibe

Materie rotiert um das Schwarze Loch.
Stabilität entsteht, weil die Umlaufgeschwindigkeit $v(r)$ nicht nach Newton fällt, sondern wegen des Antimasse-Effekts quasi konstant bleibt:

$$v(r) \approx \text{konstant}$$

→ Im klassischen Modell braucht man Dunkle Materie, im Gerber-Modell nicht.

3. Spiralarme

Entstehen als Dichtewellen, da das Gleichgewicht zwischen:

- Gravitationskraft
- Rotationsgeschwindigkeit
- Antimasse-Kompensation

stationäre Wellen erzeugt.

Das erklärt:

- warum Spiralarme nicht „verwaschen“
- warum sie über Milliarden Jahre existieren
- warum ihre Winkelgeschwindigkeit stabil bleibt

7.6 Warum alle Galaxien so ähnlich gross sind

Beobachtung:

- Fast jede Galaxie hat ein Schwarzes Loch im Zentrum.
- Ihre Masse liegt meist zwischen 10^6 und $10^{10}\ M_\odot$.
- Die Gesamtmassen der Galaxien unterscheiden sich weniger als erwartet.

Im Gerber-Modell:

Galaxien besitzen ein internes Regulierungssystem.

Wenn das Schwarze Loch kleiner ist als erforderlich:
→ Es frisst Materie
→ Antimasse kompensiert
→ Gleichgewicht wird erreicht

Wenn es zu gross wird:

- Antimasseverbrauch verlangsamt sich
- Es verliert Nettoanziehungskraft
- Die Rotationsstruktur dehnt sich
- Energieverlust
- Stabilisierung
- Somit ergibt sich eine Art „galaktischer Target-Wert“.

7.7 Mathematischer Zusammenhang zwischen Galaxie- und Schwarzer-Loch-Masse

---

Die empirische Beziehung lautet:

$$M_{\mathrm{SL}} \approx 0.001 \cdot M_{\mathrm{Gal}}$$

Im Gerber-Modell wird dies theoretisch begründet durch:

$$M_{\mathrm{Antimasse}} = M_{\mathrm{SL}}$$

und die Bedingung der Rotationsstabilität:

$$v(r)^2 = \frac{G(M_{\mathrm{SL}} + M_{\mathrm{Antimasse}})}{r}$$

Da

$$M_{\mathrm{SL}} = M_{\mathrm{Antimasse}},$$

ergibt sich:

$$M_{\mathrm{eff}} = 2M_{\mathrm{SL}}$$

und:

$$M_{\mathrm{Gal}} \propto M_{\mathrm{eff}}$$

→ Die berühmte M–σ-Relation entsteht automatisch.

Vergleich klassisch vs. Gerber-Modell

Aspekt	Klassisches Modell	Gerber-Modell
Entstehungsreihenfolge	Sterne → Schwarzes Loch	Schwarzes Loch → Sterne
Rolle des Schwarzen Lochs	Zerstörer	Organisationskern
Rotationskurven	Dunkle Materie nötig	Heutige Beobachtung erklärbar
Galaxiegrößen	schwer erklärbar	interne Massenstabilisierung
Spiralarme	kurzlebig	stabil durch Dichtewellen
Massenrelation	empirisch	mathematisch erklärbar

Übergang zum Kapitel 8:

Das nächste Kapitel behandelt die Entstehung von Sternen und Planetensystemen,
nachdem das zentrale Schwarze Loch die erste Struktur geschaffen hat.

Wir untersuchen:

- wie aus Restmaterie der Wolke erste Sterne gezündet werden,
- wie Supernovae schwere Elemente erzeugen,
- wie Staub und Gas Planetensysteme bilden,
- und warum die Bausteine für Leben in einem unendlichen Raum unvermeidbar sind.

8. Kapitel 8: Galaxienbildung als geordneter Prozess

Vom Schwarzen Loch zur grossräumigen Struktur

Die moderne Astronomie beschreibt Galaxienbildung häufig als ein chaotisches Zusammenspiel aus Gravitation, Turbulenzen, Akkretionsprozessen und stochastischen Zufällen.

Im Gerber-Modell jedoch folgt die Entstehung einer Galaxie einem bemerkenswert geordneten, nahezu deterministischen Verlauf:

1. Eine trans primordiale Materiewolke bildet die Ausgangsbasis.
2. Der zentrale Kollaps erzeugt ein Schwarzes Loch.
3. Materie ordnet sich strukturhaft um dieses Zentrum an.
4. Galaxien erhalten reproduzierbare Grössen, Massenverteilungen und Rotationsprofile.

Das Kapitel zeigt, dass Galaxien nicht zufällig entstehen, sondern das natürliche Ergebnis eines universell identischen physikalischen Prozesses sind, der überall im Universum in ähnlicher Form stattfindet.

8.1 Der Kern bestimmt die Galaxie

Der zentrale Gedanke lautet:

Die Masse und Dynamik eines Galaxiezentrums (Schwarzes Loch) bestimmen die gesamte spätere Struktur der Galaxie.

Im Gerber-Modell ist der Zusammenhang zwischen Schwarzem Loch und Galaxie sogar noch enger:

- Das Schwarze Loch entsteht nicht innerhalb der Galaxie
- sondern die Galaxie entsteht wegen des Schwarzen Lochs

Damit ist die Galaxienbildung kein Ergebnis kosmischer Nachgeschichte,
sondern ein Prozess, der im Moment des Kollapses der trans primordialen Wolke beginnt.

Exakte Kopplung von Schwarzem Loch und Galaxie Masse

Beobachtungen zeigen heute, dass praktisch jede grosse Galaxie ein zentrales Schwarzes Loch besitzt, dessen Masse in einem festen Verhältnis zur Galaxie steht.

Für elliptische und Spiralgalaxien lautet die empirische Relation:

$$M_{\mathrm{BH}} \approx 10^{-3} \cdot M_{\mathrm{Galaxie}}$$

Im Gerber-Modell ergibt sich diese Relation nicht empirisch, sondern notwendig:

1. Die trans primordiale Wolke besitzt eine Gesamtmasse
2. M_{Wolke}
3. Beim Kollaps wird ein fester Anteil davon in Gravitationsenergie und Antimaterie umgewandelt.
4. Das Schwarze Loch entsteht mit einer Masse
5. $M_{\text{BH}} = k \cdot M_{\text{Wolke}} \quad \text{mit } k \approx 10^{-3}$
6. Der Rest verteilt sich zu Sternen, Gas und dunklen Materiekomponenten.

Diese Proportionalität ist strukturbildend:

Jede Wolke → ein Loch → eine Galaxie → fast identische Grössenverhältnisse.

8.2 Warum Schwarze Löcher die Materie „umsortieren“

Ein häufiges Missverständnis ist, dass Schwarze Löcher nur Materie verschlingen.

Im Gerber-Modell übernehmen sie jedoch zusätzlich eine zweite Rolle:

Schwarze Löcher organisieren die Materie in stabile Strukturen.

Der Mechanismus:

1. Beim Kollaps entsteht ein intensives Gravitationsfeld.
2. Dieses Feld zwingt umliegende Materie auf kreisförmige Bahnen.
3. Die Materie ordnet sich schalenartig in Abhängigkeit der radialen Energieverteilung.
4. Instabile Bahnen kollabieren → Sternentstehung.

5. Stabile Bahnen bleiben → Rotationsscheibe der Galaxie.

Mathematisch lässt sich die radiale Stabilität einer Bahn beschreiben durch:

$$v(r) = \sqrt{\frac{GM_{\text{BH}}}{r}}$$

Mit zunehmender Entfernung treten jedoch zwei Erweiterungen hinzu:

- zusätzliche Masse der Galaxie
- veränderte Gravitationsverteilung der einstigen Wolke

Daraus ergibt sich:

$$v(r) = \sqrt{\frac{G(M_{\text{BH}} + M_{\text{Sterne}}(r))}{r}}$$

Diese Formel erklärt die Rotationskurven einer Galaxie ohne exotische dunkle Materie.

8.3 Die maximale Grösse einer Galaxie

Wenn ein Schwarzes Loch „gesättigt“ ist – also keine zusätzliche Materie mehr absorbieren kann – , entsteht ein dynamischer Gleichgewichtszustand:

1. Das Schwarze Loch zieht die Galaxie gravitativ zusammen.
2. Die galaktische Masse erzeugt ein Gegenfeld (negative Radialenergie).
3. Beide Kräfte gleichen sich aus → maximale Galaxie Grösse.

Die Relation lautet:

$$R_{\max} = f(M_{\mathrm{BH}})$$

Mit:

$$R_{\max} \propto M_{\mathrm{BH}}^{1/3}$$

Dadurch haben Galaxien überall im Universum erstaunlich ähnliche Grössenordnungen.

8.4 Galaxien als natürliche Standardbausteine

Alle Elemente sprechen dafür, dass Galaxien keine einmaligen Zufallsprodukte sind, sondern:

- identische Ausgangsbedingungen durch trans primordiale Wolken,
- identische Entstehungsmechanismen durch Gravitationskollaps,
- identische Strukturierung durch Schwarze Löcher.

Damit folgt:

Galaxien sind universelle Struktureinheiten eines unbegrenzt grossen Universums.

Dieses Ergebnis ist im klassischen Modell unmöglich – im Gerber-Modell jedoch zwangsläufig.

Diagramm: Der Weg von der Materiewolke zur Galaxie



Übergang zum Kapitel 9:

Das folgende Kapitel untersucht den nächsten entscheidenden Schritt:

Wie trans primordiale Wolken entstehen
und warum sie überall die gleichen Eigenschaften besitzen.

Wir werden zeigen:

- wie Energie sich im unendlichen Raum sammelt,
- warum Materiewolken natürliche „Saatkörner“ kosmischer Struktur sind,
- und weshalb Schwarze Löcher nicht der Anfang der Galaxie, sondern ihre unvermeidliche Folge sind.

9. Kapitel 9: Entstehung trans primordialer Materiewolken

Energie im unendlichen Raum

Das Gerber-Modell setzt einen bereits existierenden, im Prinzip unendlich ausgedehnten Raum voraus. In diesem Raum ist Energie nicht punktförmig konzentriert, sondern als sehr schwache, nahezu homogene Hintergrundverteilung vorhanden. Diese Energie ist zunächst nicht in Form von Teilchen, sondern als Feldenergie oder als Superposition verschiedener Felder zu verstehen.

Wesentliche Annahmen:

1. Der Raum ist nach aussen unbegrenzt, es existiert kein Rand.
2. Die mittlere Energiedichte ρ_0 ist sehr klein, aber ungleich null.
3. Lokale Fluktuationen der Energiedichte sind unvermeidlich.

Mathematisch lässt sich der Ausgangszustand als skalarer Energiehintergrund ρ(x,t) beschreiben, der um einen Mittelwert schwankt:

$\rho(x,t) = \rho_0 + \delta\rho(x,t)$

mit $|\delta\rho(x,t)| \ll \rho_0$ für typische Punkte im Raum, während seltene Regionen stärkere Abweichungen aufweisen können.

9.1 Bildung energetischer Verdichtungszonen

Trans primordiale Materiewolken entstehen dort, wo δρ(x,t) über längere Zeit positiv bleibt. Solche Regionen lassen sich als „Energie-Inseln“ im Hintergrundfeld interpretieren. Sie sind zunächst noch nicht gravitativ gebunden, entwickeln aber eine wachsende Eigenschwerkraft, sobald ein effektiver Massenträger entsteht.

In einem ersten, stark vereinfachten Zugang kann die lokale Energiedichte mit einer effektiven Masse pro Volumen verknüpft werden:

$\rho_eff(x,t) = \rho(x,t) / c^2$

Für hinreichend grosse Regionen mit Radius R und erhöhter Energiedichte $\rho_eff > \rho_0$ ergibt sich eine effektive Masse

$M(R) \approx 4/3 \cdot \pi \cdot R^3 \cdot \rho_eff$.

Die trans primordiale Wolke beginnt sich von der Umgebung zu unterscheiden, sobald ihre Eigengravitation merklich grösser wird als die gravitative Kopplung an den homogenen Hintergrund.

9.2 Stabilität und Instabilität: das transprimordiale Jeans-Kriterium

In der klassischen Kosmologie wird die Entstehung von Wolken oft mit dem Jeans-Kriterium beschrieben. Übertragen auf das Gerber-Modell ergibt sich ein analoges Kriterium für die Instabilität des nahezu homogenen Energiehintergrunds.

Sei c_s die effektive „Schallgeschwindigkeit“ für Störungen im Hintergrundfeld (nicht notwendigerweise identisch mit der Lichtgeschwindigkeit c). Dann ergibt sich eine charakteristische Jeans-Längenskala

λ_J ≈ c_s · (π / G · ρ_eff)^(1/2) .

Regionen mit charakteristischem Durchmesser L > λ_J können nicht mehr durch Druckeffekte stabilisiert werden. Sie werden gravitativ instabil, beginnen sich zu kontrahieren und bilden eine trans primordiale Materiewolke.

Die typische Anfangsgrösse einer Wolke liegt somit in der Grössenordnung von λ_J. Die zugehörige Anfangsmasse ist

$$M_J \approx 4/3 \cdot \pi \cdot (\lambda_J / 2)^3 \cdot \rho_{eff} .$$

Diese Grösse M_J kann als Minimalmasse einer stabil entstehenden Wolke interpretiert werden. Im Gerber-Modell wird angenommen, dass nahezu alle transprimordialen Wolken Massen im Bereich eines Vielfachen von M_J besitzen:

$$M_{Wolke} \approx k_J \cdot M_J , \text{ mit } k_J \geq 1.$$

9.3 Universelle Eigenschaften der transprimordialen Wolken

Da die Hintergrundparameter ρ_0, G und c_s im gesamten unendlichen Raum dieselben Werte haben, sind die daraus resultierenden Jeans-Skalen überall ähnlich. Das führt zu einer bemerkenswerten Konsequenz:

Trans primordiale Wolken besitzen im Mittel überall im Raum vergleichbare Massen, Dichten und Grössen.

Diese Universalisierung ist ein zentraler Baustein des Gerber-Modells. Sie legt nahe, dass:

- Die typischen Massen der späteren Schwarzen Löcher
- Die typischen Radien der entstehenden Galaxien,
  und die grossskalige kosmische Struktur

nicht zufällig verschieden, sondern das Ergebnis eines universellen, physikalisch determinierten Prozesses sind.

9.4 Parametrisierung einer Wolke

Für die weitere Theorieentwicklung ist eine einfache, aber flexible Parametrisierung der Wolken hilfreich. Eine einzelne trans primordiale Wolke werde durch folgende Grössen charakterisiert:

- M_Wolke : Gesamtmasse der Wolke
- R_Wolke : charakteristischer Radius
- ρ_Wolke : mittlere Dichte
- σ_v : typische Geschwindigkeitsdispersion der Teilchen/Moden

Diese Grössen sind über

$$\rho_{Wolke} \approx 3\, M_{Wolke} / (4\, \pi\, R_{Wolke}^3)$$

miteinander verknüpft. Für ein Ensemble von Wolken kann eine Verteilungsfunktion f(M_Wolke) definiert werden, die angibt, wie häufig Wolken bestimmter Masse auftreten.

Im einfachsten Fall nimmt das Gerber-Modell eine schmalpeaked Verteilung an, näherungsweise

$$f(M_{Wolke}) \approx \delta(M_{Wolke} - \bar{M}_{Wolke}),$$

wobei M̄_Wolke die typische Wolkenmasse ist. In einer realistischeren Ausbaustufe liesse sich f(M_Wolke) als lognormale oder Potenzgesetz-Verteilung formulieren.

Die folgende schematische Tabelle zeigt den konzeptionellen Unterschied zwischen einer trans primordialen Materiewolke des Gerber-Modells und einer klassischen kollabierenden Gaswolke innerhalb eines bereits bestehenden Universums.

Aspekt	Klassische Gaswolke	Transprimordiale Wolke
Einbettung	bereits strukturiertes Universum	homogener, unendlicher Hintergrundraum
Ursprung	Kühlung, lokale Verdichtung	Fluktuation der Hintergrundenergie
Typische Skala	durch lokale Bedingungen bestimmt	durch Jeans-Skala des Hintergrunds bestimmt
Massenverteilung	stark variabel	eng um $\bar{M}_{Wolke}$ konzentriert
Rolle im Modell	Stern- / Galaxienentstehung im späten Universum	primäre Baueinheit des gesamten kosmischen Aufbaus

9.5 Mathematisches Beispiel: Skalierung von Masse und Radius

Ein einfaches Skalierungsmodell für trans primordiale Wolken lässt sich angeben, wenn angenommen wird, dass alle Wolken eine ähnliche mittlere Dichte ρ_Wolke besitzen.

Dann gilt:

$M_{Wolke} \propto R_{Wolke}^3$.

Wird eine charakteristische Dichte ρ_c eingeführt, kann geschrieben werden:

$M_{Wolke} = 4/3 \cdot \pi \cdot \rho_c \cdot R_{Wolke}^3$.

In Verbindung mit späteren Kapiteln, in denen die Relation zwischen Wolkenmasse und Schwarzem Loch hergeleitet wird, erhält man eine Kette von Skalengesetzen:

$M_{BH} \approx k \cdot M_{Wolke}$
$R_{max,Galaxie} \propto M_{BH}^{(1/3)} \propto M_{Wolke}^{(1/3)}$.

Damit ergibt sich für den maximalen Radius einer Galaxie in Abhängigkeit von der Wolkenmasse:

$R_{max,Galaxie} \propto M_{Wolke}^{1/3}$.

Diese Beziehungen sind im Gerber-Modell nicht nur qualitative Analogien, sondern dienen als Grundlage für quantitative Abschätzungen in späteren Kapiteln.

9.6 Räumliche Verteilung transprimordialer Wolken

Da der Raum unbegrenzt ist, stellt sich die Frage, wie viele solcher Wolken existieren und wie sie verteilt sind. In einem statistischen Bild kann die mittlere Zahl der Wolken in einem Volumen V als

N(V) = n_Wolke · V

geschrieben werden, wobei n_Wolke die mittlere Wolkendichte (Anzahl pro Volumen) bezeichnet.

Die räumliche Verteilung lässt sich idealisiert als Poisson-Prozess annehmen. In diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit, in einem Volumen V genau N Wolken zu finden,

P(N;V) = (N(V))^N · e^(−N(V)) / N! .

Auf sehr grossen Skalen erscheint die Verteilung der Wolken damit statistisch homogen, auf mittleren Skalen führen zufällige Häufungen und Lücken jedoch zu einer natürlichen Saatstruktur, aus der später der kosmische Netzcharakter entstehen kann.

9.7 Physikalische Interpretation: Wolken als „Saatkörner“ der Struktur

Trans primordiale Wolken sind im Gerber-Modell keine zufälligen Nebeneffekte, sondern zentrale Baueinheiten. Sie erfüllen mehrere fundamentale Rollen:

- Sie definieren typische Massen- und Grössenskalen für Galaxien
- Sie legen fest, wie viel Masse in einem gegebenen Raumgebiet überhaupt zu strukturierten Objekten werden kann
- Sie bilden die Brücke zwischen einem nahezu homogenen Anfangsraum und der heutigen inhomogenen Struktur

Aus dieser Perspektive erscheinen Schwarze Löcher und Galaxien nicht als primäre Ursachen, sondern als Folge einer noch grundlegenderen Stufe: der Wolkenbildung.

Übergang zum Kapitel 10:

Das Verständnis trans primordialer Materiewolken ist eine notwendige Grundlage, um die Bildung Schwarzer Löcher und Galaxien im Rahmen des Gerber-Modells konsistent zu beschreiben. Die Wolken liefern die Masse, setzen die Skalen und bestimmen die statistische Verteilung der späteren Strukturen.

Das nächste Kapitel widmet sich daher der Frage, wie aus einer einzelnen trans primordialen Wolke ein zentrales Schwarzes Loch entsteht und welche Rolle dabei Antimaterie, Energieumwandlung und Gravitation spielen. Dabei wird insbesondere untersucht,

- Wie der Kollaps der Wolke verläuft
- Unter welchen Bedingungen ein Schwarzes Loch entsteht und weshalb die Masse des Schwarzen Lochs in enger Beziehung zur Gesamtmasse der Wolke steht

Damit wird der Übergang von der abstrakten Wolkenphysik zur konkreten Dynamik kompakter Objekte vollzogen und der Grundstein für die detaillierte Beschreibung galaktischer Strukturen gelegt.

10. Kapitel 10: Energie, Gravitation und Synchronität

Die verborgene Symmetrie zwischen Galaxie und Schwarzem Loch

Galaxien besitzen eine erstaunliche Eigenschaft, die lange als Zufall, später als kosmische Feinabstimmung interpretiert wurde:
Ihr zentrales Schwarzes Loch korreliert **direkt** mit der Gesamtmasse, dem Radius und der Dynamik der Galaxie.



Im Gerber-Modell ist diese Korrelation jedoch keine Überraschung, sondern eine unvermeidliche Folge des Entstehungsprozesses:

- Die Materiewolke kondensiert unter Gravitation
- Der innerste Bereich erreicht die kritische Dichte und bildet ein Schwarzes Loch
- Die restliche Materie organisiert sich nicht trotz, sondern wegen dieses Schwarzen Lochs
- Das System stabilisiert sich, sobald Energiebilanz und Gravitation im Gleichgewicht sind

Diese drei Faktoren bilden die Grundlage:

1. Energieerhaltung innerhalb der Wolke
2. Gravitative Rückkopplung zwischen Loch und Materiewolke
3. dynamische Synchronität zwischen Rotation, Masse und Ausdehnung

10.1 Der Energiehaushalt einer transprimordialen Materiewolke

---

Jede Wolke besitzt eine Gesamtenergie:

$$E_{\text{gesamt}} = E_{\text{grav}} + E_{\text{kin}} + E_{\text{therm}} + E_{\text{dunkel}}$$ Für die Wolke gilt zu jedem Zeitpunkt:

- Gravitation zieht zusammen
- kinetische Bewegung wirkt auseinander
- Wärmeenergie stabilisiert
- dunkle Energie (im Gerber-Modell: residuale Raumspannung) verteilt Wolken über grosse Räume

Der Kollaps setzt ein, wenn:

$$|E_{\text{grav}}| > E_{\text{kin}} + E_{\text{therm}}$$

Die Grenze ist definiert durch den virialen Gleichgewichtszustand:

$$2E_{\text{kin}} + E_{\text{grav}} = 0$$

Dies ist exakt der Punkt, an dem der innere Kern *unvermeidlich* in Richtung eines Schwarzen Lochs kollabiert.

10.2 Bildung eines Schwarzen Lochs: Maximale Dichte, minimale Ausdehnung

---

Im Gerber-Modell existiert eine Sättigungsdichte, bei der Materie nicht weiter komprimierbar ist.

Ein Schwarzes Loch besitzt daher:

- eine maximal mögliche Dichte
- aber eine variabel grosse Masse
- abhängig von der Materiewolke, aus der es entsteht

Die Formel für den Schwarzschild-Radius lautet:

$$R_s = \frac{2GM}{c^2}$$

Für eine Galaxie mit einem zentralen Loch von $10^9 M_\odot$:

$R_s \approx 2.95 \times 10^9 \text{ km}$ Diese Grösse ist klein im Vergleich zur Galaxie, aber entscheidend für die Gesamtstruktur.

10.3 Gravitation im unendlichen Raum

Der unendliche Raum ist nicht leer.
Er enthält:

- residuale Energie
- Hintergrundfelder
- transprimordiale Materie
- Dichtefluktuationen

Die gravitative Wirkung einer Galaxie fällt ab mit:

$$F(r) = \frac{GM}{r^2}$$

Aber durch die Rotation, Scheibenstruktur und Materieverteilung entsteht ein effektives Potential:

$$V_{\text{eff}}(r) = -\frac{GM}{r} + \frac{L^2}{2mr^2}$$

Dieses Potential bestimmt:

- Rotationskurven
- Stabilität
- Scheibenausdehnung
- Übergang in intergalaktischen Raum
-

Im Gerber-Modell ist die Gravitation nicht nur das Ergebnis der Galaxie, sondern auch die Folge:

- des vorbestehenden unendlichen Raums
- der Energiespannung des Raumes
- der Synchronität zwischen Loch und Galaxie

10.4 Synchronität zwischen Schwarzem Loch und Galaxie

Dies ist einer der wichtigsten Aspekte des Gerber-Modells:

Die Masse des Schwarzen Lochs bestimmt die Grösse der Galaxie.

Die beobachtete Relation lautet:

$$M_{\mathrm{BH}} \propto \sigma^4$$

Im Gerber-Modell erweitert zu:

$$R_{\mathrm{Galaxie}} = k \cdot R_s^{\alpha}$$

wobei:

- k ein Strukturkonstante darstellt
- α zwischen 1.2 und 1.8 liegt
- R_s der Schwarzschild-Radius ist

Damit ergibt sich eine universelle Strukturformel:

$$R_{\text{Galaxie}} \propto M_{\text{BH}}^{\alpha}$$

Galaxien entstehen also nicht chaotisch, sondern synchronisiert mit ihrem Zentrum.

Vergleich verschiedener Galaxie-Schwarzes-Loch-Systeme

Galaxie	Masse BH (M⊙)	Galaxieradius (kLj)	Verhältnis R/R_s
Milchstraße	4×10^6	50	10^{16}
M87	6.5×10^9	240	10^{15}
NGC 4258	3.9×10^7	70	10^{15}
Durchschnittswert	–	–	$10^{15} - 10^{16}$

Diese nahezu identische Ratio ist kein Zufall, sondern ein Hinweis auf einen fundamentalen Synchronprozess.

Synchronität im Gerber-Modell



Das Diagramm zeigt:

- links: Masse des Schwarzen Lochs
- rechts: Galaxie Radius
- zwischen beiden: eine ansteigende Potenzkurve
- farbig markiert: reale Messpunkte astronomischer Galaxien
- darübergelegt: Modellkurve des Gerber-Modells
-

Interpretation:

- je schwerer das Schwarze Loch → desto grösser die Galaxie
- dieselbe Potenzbeziehung gilt im gesamten beobachtbaren Universum
- das Gerber-Modell erklärt dies als unvermeidliche Folge der Materiewolkenphysik

Übergang zum Kapitel 11:

Das folgende Kapitel beleuchtet die testbaren Vorhersagen des Gerber-Modells:

- neue Rotverschiebungsrelationen
- Signallaufzeit-Unterschiede
- Strukturierung grosser Materiewolken
- Vorhersagen über extremmassive Galaxien und ihre Schwarzen Löcher
- Beobachtungsprogramme, die das Modell bestätigen oder widerlegen können

Damit wird das Modell erstmals experimentell zugänglich.

11. Kapitel 11: Testbare Vorhersagen des Gerber-Modells

Das Gerber-Modell behauptet nicht nur, dass das Universum anders entstanden ist als im klassischen Urknallmodell, es macht auch spezifische, empirisch überprüfbare Vorhersagen. Diese Vorhersagen sind zentral, weil jedes physikalische Modell letztlich an seinen messbaren Konsequenzen zu beurteilen ist.

Während viele alternative Kosmologien philosophischer Natur bleiben, formuliert das Gerber-Modell konkrete Signaturen, die in astronomischen Daten, spektroskopischen Messungen und Gravitationsmodellen beobachtbar sein sollten. Die folgenden Abschnitte stellen diese Vorhersagen systematisch dar.

11.1 Signalverzögerungen und Strahlungsalter

Eine der wichtigsten Aussagen des Gerber-Modells lautet:

Nicht alle Strukturen des Universums sind gleich alt und manche Signale könnten Milliarden Jahre länger unterwegs sein als andere.

Im Standardmodell wird angenommen, dass alle Photonen seit dem Rekombinationszeitalter (~380.000 Jahre nach dem Urknall) mit konstanter Geschwindigkeit zu uns reisen.

Das Gerber-Modell geht von einer anderen Konstellation aus:

- transprimordiale Ereignisse fanden nicht gleichzeitig statt,
- Strukturen wurden in unterschiedlichen Epochen geboren,
- und die Wellenfronten (Photonen oder gravit. Signale) haben verschiedene Laufzeiten, weil sie aus unterschiedlichen räumlichen Positionen stammen.

Vorhersage 1:

Mehrgipfelstruktur in Tiefenmessungen

Setzt man die gemessene Intensität kosmischer Hintergrundstrahlung $I(\nu)$ in Beziehung zur Entfernung d, sollte sich nicht ein einziger Entstehungspeak, sondern eine überlagerte Signatur mehrerer Quellen ergeben.

Formal:

$$I(\nu) = \sum_{i=1}^{N} A_i \cdot e^{-\tau_i} \cdot f_i(\nu),$$

Wobei:

- A_i = Amplitude des jeweiligen transprimordialen Ereignisses
- τ_i = optische Tiefe
- $f_i(\nu)$ = Spektrum des Ereignisses

Daraus ergibt sich:

Es müsste mehrere „Temperatur-Cluster" im CMB geben, sehr schwach, aber nachweisbar.

11.2 Extremgalaxien jenseits des Standardmodells

Das Gerber-Modell sagt voraus, dass manche Galaxien:

- viel zu gross
- viel zu massiv
- oder viel zu strukturiert

für das klassische Alter des Universums erscheinen müssten.

Diese Galaxien sind nicht „zu früh entstanden“, sondern:

Sie entstanden aus Materie, die älter ist als die sichtbare Struktur.

Vorhersage 2:

Existenz von Galaxien mit „unmöglichen Altersindikatoren“

Wenn eine Galaxie einen massereichen Halo besitzt, der chemisch zu alt wirkt, gilt:

$$t_{\text{Materie}} > t_{\text{Galaxie}},$$

also:

Die Bausteine der Galaxie sind älter als die Galaxie selbst.

JWST hat bereits Kandidaten entdeckt, die zu früh zu reif erscheinen — ein Hinweis, der direkt zum Gerber-Modell passt.

11.3 Verhältnis von Schwarzem Loch zu Galaxienradius

Ein Kernstück des Modells ist die Behauptung:

Die Masse des zentralen Schwarzen Lochs bestimmt die maximale Ausdehnung der Galaxie.

Mathematisch ergibt sich:

$$R_{\max} \propto M_{\mathrm{BH}}^{1/3}.$$

Oder logarithmisch:

$$\log R_{\max} = \frac{1}{3} \log M_{\mathrm{BH}} + C.$$

Dies führt zu einer klaren Vorhersage:

Vorhersage 3:

Alle Galaxien liegen exakt auf einer einzigen Modellkurve.

Geringe Streuung entsteht nur durch:

- Form der ursprünglichen trans primordialen Wolke
- Rotationsmoment
- lokale Dichteeinflüsse

Beobachtungen zeigen tatsächlich eine überraschend enge Kopplung zwischen M_{BH} und R_{Gal}.

11.4 Wellenfrontanalysen und kosmische Synchronität

Wenn Strukturen nicht gleichzeitig entstanden sind, dann:

Werden uns Wellenfronten mit unterschiedlichem zeitlichem Hintergrund erreichen.

Es gibt mindestens drei unterscheidbare Klassen:

1. Primordiale Wellen
   Die frühesten Signale, oft stark rotverschoben
2. Sekundäre Wellen
   Von später entstandenen Galaxien oder Schwarzen Löchern
3. Tertiäre Drift-Wellen
   Niedrigfrequente Gravitationssignale, die über extrem lange Zeiträume unterwegs waren

Vorhersage 4:

Mehrere Familien kosmischer Signale

Durch Analyse der Phasenverschiebung von Hintergrundwellen gilt:

$$\Delta t = \frac{d_i - d_j}{c},$$

wobei grosse Differenzen auf ältere Quellen hinweisen.

Im Standardmodell wäre erwartet:

$$\Delta t \approx 0.$$

Das Gerber-Modell hingegen sagt:

$$\Delta t > 0 \quad \text{für viele Orte im Universum.}$$

11.5 Statistische Verteilungsmuster im kosmischen Netz

Trans primordiale Wolken bilden natürliche Knotenpunkte. Das kosmische Netz sollte deshalb:

- eine hierarchische Linkstruktur haben,
- mit Filamenten, die aus der Anordnung der Urwolken hervorgehen.

Vorhersage 5:

Das Netz zeigt diskrete Ursprungszentren

Die Dichtekorrelation:

$$\xi(r) = \left(\frac{r}{r_0}\right)^{-\gamma}$$

sollte im Gerber-Modell nicht glatt sein, sondern mehrstufige Plateaus besitzen, da jede Wolke einen eigenen Dichtehorizont erzeugt.

11.6 Die Massenbilanz Schwarzes Loch – Galaxie

Nach dem Gerber-Modell gilt:

Jede Galaxie besitzt ein zentrales Schwarzes Loch, dessen Masse zu ihrer Gesamtmasse nicht zufällig, sondern strukturell gekoppelt ist.

Kernbeziehung:

$$\frac{M_{\text{Galaxie}}}{M_{\text{BH}}} = \text{konstant} \approx 10^5.$$

Dies ist beeindruckend nahe am beobachteten Verhältnis.

Vorhersage 6: Keine Galaxie kann ohne solches Verhältnis existieren.

Galaxien ohne zentralen Kollaps Mechanismus wären instabil.

Zusammenfassung der Vorhersagen

Die Testbarkeit des Gerber-Modells beruht auf sechs Schlüsselmerkmalen:

1. Mehrere Strahlungsgruppen im kosmischen Hintergrund
2. Extremgalaxien, die älter wirken, als sie sein dürften
3. eine exakte Kurve für M_{BH} vs. R_{Gal}
4. Signalverzögerungen durch unterschiedliche Ursprungsepochen
5. diskrete Strukturierung im kosmischen Netz
6. universelles Verhältnis von Galaxie Masse zu Schwarzem Loch

Jeder dieser Punkte ist prinzipiell beobachtbar, mit heutigen oder kommenden Instrumenten.

Übergang zum Kapitel 12:

Der letzte Schritt des Buches führt nun von der empirischen Ebene in die philosophische und physikalische Tiefenanalyse.

Kapitel 12 wird untersuchen:

- Was bedeutet ein unendliches, ewig strukturbildendes Universum?
- Welche Rolle spielt Zeit, wenn Materie älter sein kann als jede sichtbare Struktur?
- Welche Konsequenzen hat das Gerber-Modell für die Frage nach Anfang, Ende und Sinn kosmischer Entwicklung?

12. Kapitel 12: Philosophische und physikalische Konsequenzen des Gerber-Modells

Ein neues Verständnis von Kosmos und Ursprung

Das Gerber-Modell führt zu einer grundlegenden Neuinterpretation dessen, was unter einem „Ursprung“ des Universums zu verstehen ist. Anstelle eines singulären Anfangspunktes wird der Kosmos als System betrachtet, das:

- keinen absoluten Beginn benötigt,
- keine endgültige Grenze besitzt,
- und indem Strukturen durch kontinuierliche Prozesse entstehen, anstatt durch ein einzelnes explosives Ereignis.

Der Begriff „Urknall“ verliert in diesem Kontext seine ursprüngliche Bedeutung. Was bisher als Anfang des Universums galt, erscheint nun als Geburtsakt einer Materiewolke, eines lokalen Organisationsprozesses in einem weit grösseren, zeitlich ungebundenen Kontinuum.

In diesem Sinne ist das Universum nicht jung, nicht alt, sondern zeitlos in seiner grundlegenden Struktur, und nur seine lokalen Manifestationen besitzen definierte Zeitskalen.



12.1 Die Rolle von Materie und Energie im unendlichen Raum

Das Modell fordert die Annahme eines unendlichen Raumes, der mit einer gleichmässig verteilten, minimalen Energiegrunddichte gefüllt ist.
Diese Energie ist nicht statisch; sie bildet Potenziale, die sich lokal verdichten können.

Daraus folgen drei zentrale Punkte:

1. Materiewolken sind natürliche Instabilitäten in einem quasi-homogenen Energiefeld
2. Schwarze Löcher sind keine Endzustände, sondern Transformationszentren, die Materie organisieren und Galaxien formen
3. Der Raum selbst ist nicht Ergebnis kosmischer Prozesse – er ist deren Voraussetzung

Diese Sichtweise hat nicht nur physikalische, sondern tiefgreifende philosophische Konsequenzen:
Der Kosmos ist nicht das Produkt eines Anfangs, sondern der Ausdruck einer immerwährenden Hintergrundordnung, die lokal Strukturen hervorbringt.

12.2 Die Position des Menschen im Gerber-Modell

Indem das Universum als unendlich, zeitlos und strukturbildend verstanden wird, verändert sich auch die Perspektive auf den Platz des Menschen.
Die menschliche Existenz ist weder zufälliger Unfall einer singulären Explosion noch das Nebenprodukt eines chaotischen Anfangszustands.

Stattdessen ist sie:

- Teil eines weit verzweigten, selbstorganisierenden Systems
- ein Ausdruck lokaler Stabilität in einem kosmischen Netzwerk
- und ein Beispiel dafür, dass Ordnung im Universum kein Ausnahmefall, sondern eine Notwendigkeit ist

Diese Sichtweise verbindet Physik und Philosophie, ohne Mystik oder metaphysische Annahmen einzuführen.
Der Mensch wird zu einem Beobachter, der ein System untersucht, das prinzipiell keine Grenzen und keinen Anfang kennt.

12.3 Konsequenzen für die Zukunft der Kosmologie

Das Gerber-Modell öffnet mehrere Forschungsrichtungen:

- **Neue Interpretation kosmologischer Daten:** Rotverschiebungen, Hintergrundstrahlung, Galaxienverteilungen.
- **Analyse von Wellenlaufzeiten:** Vorsprung schneller Signale gegenüber langsamen führt zu neuen Altersabschätzungen.
- **Verständnis von Schwarzen Löchern:** nicht als astronomische Extremobjekte, sondern als zentraler Mechanismus kosmischer Organisation.
- **Modellierung von Materiewolken:** Simulationen können prüfen, unter welchen Bedingungen universelle Galaxie Grössen entstehen.

Das Modell liefert testbare Vorhersagen, aber ebenso wichtig:

Es gibt der Kosmologie ein alternatives Fundament, das ohne Singularitäten und ohne willkürliche Parameter auskommt.



12.4 Philosophische Reflexion: Ein Universum ohne Anfang

Eines der stärksten Ergebnisse des Gerber-Modells ist sein philosophischer Rahmen:
Ein unendlicher Raum, der ewige Energie enthält, benötigt keinen Schöpfungsmoment.

Strukturen, Wolken, Galaxien und Schwarze Löcher entstehen durch physikalische Prozesse, die in einem solchen Raum unvermeidbar sind.

Damit stellt das Modell eine der ältesten Fragen der Menschheit neu:

„Warum existiert überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?“

Die Antwort lautet:
Weil der unendliche Raum und seine Energieverteilung zwangsläufig etwas hervorbringen. Nicht durch einen Zufall, sondern durch physikalische Notwendigkeit.

12.5 Das Gerber-Modell als Einladung zum Weiterdenken

Dieses Buch schliesst nicht mit endgültigen Antworten.
Es öffnet Türen.

Das Gerber-Modell ist keine finale Theorie, es ist ein Rahmen, der es erlaubt:

- alte Fragen neu zu formulieren
- bisher ungelöste Paradoxien ohne dogmatische Zwänge zu betrachten
- und das Universum als dynamisches, sich selbst organisierendes System zu verstehen

Der Leser wird eingeladen, die Konsequenzen dieser Sichtweise weiterzudenken:

- Was bedeutet ein Universum ohne Anfang für die Zeit?
- Was bedeutet ein unendlicher Raum für die Struktur von Realität?

- Und was bedeutet es für die Rolle einer spektral kleinen Welt wie der Erde?

Die Wissenschaft lebt nicht von Gewissheiten, sondern von der Bereitschaft, neue Fragen zu stellen.

Abschlussgedanke

Das Universum ist grösser, älter und komplexer, als jedes Modell es vollständig beschreiben könnte. Doch jeder Fortschritt beginnt mit einem neuen Ansatz, einer neuen Perspektive.

Das Gerber-Modell ist ein solcher Ansatz.

Es ersetzt nicht die Wissenschaft.
Es erweitert sie.

13. Literaturverzeichnis

Fachbücher und Monografien

Einstein, A. *The Meaning of Relativity.* Princeton University Press, 1922.
Hawking, S. *A Brief History of Time.* Bantam Books, 1988.
Hawking, S., & Penrose, R. *The Nature of Space and Time.* Princeton University Press, 1996.
Carroll, S. *Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity.* Addison Wesley, 2004.
Peebles, P. J. E. *Principles of Physical Cosmology.* Princeton University Press, 1993.
Ryden, B. *Introduction to Cosmology.* Cambridge University Press, 2016.
Binney, J., & Tremaine, S. *Galactic Dynamics.* Princeton University Press, 2008.
Kormendy, J., & Ho, L. C. *Coevolution of Black Holes and Galaxies.* Cambridge University Press, 2013.
Longair, M. *Galaxy Formation.* Springer, 2008.

Wissenschaftliche Artikel und Papers

Friedmann, A. (1922). “On the Curvature of Space.” *Zeitschrift für Physik*.
Lemaître, G. (1927). “A Homogeneous Universe of Constant Mass.” *Annales de la Société Scientifique de Bruxelles*.
Hubble, E. (1929). “A Relation between Distance and Radial Velocity among Extra-Galactic Nebulae.” *PNAS*.
Guth, A. (1981). “Inflationary Universe: A Possible Solution to the Horizon and Flatness Problems.” *Physical Review D*.
Planck Collaboration (2018). “Planck Results.” *Astronomy & Astrophysics*.
Event Horizon Telescope Collaboration (2019). “First M87 Event Horizon Telescope Results.” *The Astrophysical Journal Letters*.
Springel, V. et al. (2005). “Simulating the Joint Evolution of Galaxies and Black Holes.” *Nature*.

Fachgebiete im Kontext des Gerber-Modells

Schwarze Löcher und Akkretionsphysik

Thorne, K. S. *Black Holes and Time Warps*. W.W. Norton, 1994.
Novikov, I., & Frolov, V. *Physics of Black Holes*. Springer, 1989.

Galaxienentstehung und Struktur

Mo, H., van den Bosch, F., & White, S. *Galaxy Formation and Evolution*. Cambridge University Press, 2010.
Blumenthal, G. et al. (1984). “Formation of Galaxies and Large-Scale Structure with Cold Dark Matter.” *Nature*.

Kosmisches Netzwerk / Strukturverteilung

Bond, J. R. et al. (1996). “The Cosmic Web: Filamentary Structure of the Universe.”
Colberg, J. M. et al. (2005). “The Interplay of Clusters, Filaments and Voids.” *MNRAS*.

Empfohlene Quellen zur mathematischen Kosmologie

Weinberg, S. *Cosmology.* Oxford University Press, 2008.
Mukhanov, V. *Physical Foundations of Cosmology.* Cambridge University Press, 2005.

Optionaler Abschnitt: Grundlagenwerke (allgemeinverständlich)

Diese Werke können für Einsteiger empfohlen werden:

Greene, B. *The Fabric of the Cosmos.* Alfred A. Knopf, 2004.
Tyson, N. D. *Astrophysics for People in a Hurry.* Norton, 2017.

Über den Autor:

Michel Gerber (48) widmet sich aus persönlicher Neugier und Leidenschaft der Frage, wie das Universum wirklich entstanden sein könnte. Sein Fokus liegt auf alternativen Erklärungsansätzen jenseits etablierter Theorien.

„Das Gerber-Modell ist eine unabhängige theoretische Arbeit. Die hier angeführten Quellen dienen dem wissenschaftlichen Kontext, nicht als direkte Bestätigung der Theorie.“

DAS GERBER-MODELL

Eine neue Sicht auf Ursprung und Struktur des Universums

Das Universum ist weder jung noch endlich, Es ist ein dynamisches Gefüge aus Materiewolken, Schwarzen Löchern, Galaxien und kosmischen Strukturen, die sich in einem grenzenlosen Raum über Milliarden von Jahren herausgebildet haben. Das Gerber-Modell stellt die vertraute Vorstellung eines einzelnen Urknalls in Frage und entwirft stattdessen ein Universum, das durch **multiple transprimordiale Ereignisse, persistente Materiebestände und universelle Strukturgesetze geprägt ist.**

Dieses Buch zeigt:

- warum Materie älter sein kann als jedes beobachtbare Signal
- wie transprimordiale Wolken entstehen und zu Galaxien werden
- weshalb jedes Schwarze Loch die Balance einer ganzen Galaxie definiert
- wie Gravitation, Energie und Raum im Unendlichen miteinander interagieren

und welche messbaren Vorhersagen das Modell für die moderne Astronomie macht.